

5 DÍAS ANTES DE SU EXAMEN:

Puede tomar Tylenol. Si tiene un trastorno cardíaco, tuvo un infarto reciente o una colocación de stent coronario, debería analizar esto con su cardiólogo o médico de atención primaria antes de dejar de tomar cualquier agente anticoagulante. Si está tomando anticoagulantes como Coumadin, Plavix, Pradaxa, Effient, Bilinta o Xarelto debería analizar con su cardiólogo o médico de atención primaria cómo administrar sus anticoagulantes y, **SI** debería dejar de tomarlos antes del procedimiento. Sin embargo, si ha tenido una válvula cardíaca mecánica, historial de trombosis venosa profunda en sus piernas, o una embolia pulmonar, es posible que necesite **Lovenox** o **Heparin** hasta el día del procedimiento. Por favor sepamos si usted no se le permite poner fin a estos medicamentos

- Si tiene diabetes, su medico primaria le aconsejara como manejar sus medicamentos antes del procedimiento (insulina), ya que se tiene que estar en ayunas.

MEDICAMENTOS A DISCONTINUAR ANTES DEL PROCEDIMIENTO:

-Ciertos medicamentos afectan el esófago y podrían proporcionar resultados inadecuados

- Llame a nuestra oficina antes de agregar cualquier medicamento que no se haya mencionado previamente.

(A) ESTUDIO DE MOTILIDAD ESOFÁGICA:

- Medicamentos para presión e el corazón- bloqueante de los canales de calcio, Dilacor, Cardizem, Calan, Norvasc, Procardia- (Por favor hablar con su medico primaria o su Cardiólogo antes de detenerse)= 2 días antes del procedimiento

| | | | |
|--------------|--------|-----------------------|----------|
| Aspirina | 2 días | Lortab | 2 días |
| Atrovent | 2 días | Metoclopramida | 3 días |
| Biaxin | 2 días | Nitroglicerina | 12 horas |
| Eritromicina | 2 días | Soma | 3 días |
| Entex LA | 2 días | Tylox | 2 días |
| Guaifenesin | 2 días | Vistaril | 3 días |
| Histussin | 2 días | Zithromax | 2 días |
| Inderal LA | 3 días | Tums, Maalox, Rolaids | 2 días |

pH-METRÍA DE 24 HORAS (BRAVO):

- A menos que se discutió específicamente con su proveedor favor discontinuar medicamentos:

- Inhibidores de la bomba de protones: Protonix, Prilosec, Prevacid, Nexium, Zegerid, Dexilant y Aciphex - **discontinuar por 7 días**
- Bloqueadores H2: Axid, Pepcid, Tagamet y Zantac - **discontinuar por 7 días**
- Antiácidos: Tums, Maalox, Rolaids - **discontinuar por 1 día**

PH-METRIA- ZEPHYR- IMPEDANCIA

- Consulte con su proveedor si pruebas que va a hacerse sobre los medicamentos o de medicamentos.

1 DIA ANTES DE SU EXAMEN:

- Usted lo hace una cena normal, pero dejar de comer alimentos sólidos después de 19:00. Restringir su dieta a líquidos claros a partir de entonces no solo hasta después del procedimiento. ¡Mantenerse hidratado!

EI DIA DE SUE EXAMEN

- Recuerda que no debes comer ningún alimento hasta después del procedimiento.
- Usted puede tomar agua hasta 4 horas antes de su procedimiento.
- Si tiene diabetes, controle el nivel de azúcar en sangre antes de venir a su examen y traiga la lectura con usted. Si toma medicamentos orales para la diabetes, no los tome la mañana del procedimiento salvo indicación en contrario de su médico. Si toma insulina, traiga la insulina con usted. Si toma insulina en la mañana, tome sólo la ½ de su dosis habitual.
- Recuerde TOMAR SUS MEDICAMENTOS HABITUALES (no anticoagulantes, no antiinflamatorios no esteroides, no aspirinas, no Plavix) la mañana del procedimiento.
- Se puede tomar poquita agua hasta 4 horas antes de su procedimiento

Usted no será sedado para estas pruebas (Motilidad y Zephyr) y por lo tanto, no se necesita un conductor designado. Para las otras pruebas (EGD/BRAVO), por favor traiga un conductor como usted será sedado para el examen. Si usted esta pensando en tomar un taxi a casa, después un amigo debe acompañarte. Usted no puede conducir por 12 horas después del procedimiento.

- Usted estará en el Laboratorio de Endoscopia aproximadamente dos a tres horas. El médico hablará con usted después del examen y le dará recomendaciones para la dieta, medicamentos, cuidados posteriores, etc. Use ropa cómoda; traiga sus lentes, dispositivos auditivos, tarjeta(s) del seguro y formulario de información completo.
- Esperaremos el pago de copagos, coseguros y deducibles en el momento de la atención médica.
- Si su seguro requiere una recomendación, usted debería comunicarse con su médico de atención primaria para coordinar que recibamos la recomendación antes del procedimiento.
- **Usted puede recibir CUATRO cuentas por separado por este procedimiento: 1 - Médico, 2 - Instalaciones, 3 – Anestesia, 4 - Patología**

Información adicional se puede encontrar en nuestro sitio web: www.utahgastro.com
